

# Hypoaspis-System

Rovmidd (*Stratiolaelaps scimitus*)  
(Tidligere kjent som *Hypoaspis miles*)

**Bruksformål:** Mot jordlevende stadier av mygg og fluer som f. eks. hærmygg, soppmygg og vannfluer, samt trips og spretthaler i plantekulturer i veksthus, plasttunnel, innendørs og ved matsopproduksjon.

**Sammensetning:** Egg, nymfer og voksne *Stratiolaelaps scimitus* i vermikulitt og torv tilsatt kopramidd (*Thyrophagus putrescentiae*).

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.  
Unngå innånding av støv.  
Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** BIOBEST N.V. Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. nr.:** 2018.76

**Netto innhold:** se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

*Stratiolaelaps scimitus* kan brukes i alle plantekulturer i veksthus, plasttunneler og i innendørsbeplantning med organisk vekstmedium, samt ved produksjon av matsopp.

**Virkeområde:**

*Stratiolaelaps scimitus* bekjemper egg, larver og pupper av hærmygg (*Sciaridae spp.*), soppmygg, vannfluer og andre mygg og små fluer i vekstmediet. De foretrekker små larvestadier. Spiser også trips og spretthaler.

**Virkemåte:**

Voksne og nymfer søker aktivt etter jordboende insektstadier, og suger ut kroppsvæsken til byttedyret. *Stratiolaelaps scimitus* oppholder seg i og på vekstmediet rundt plantens stengel. Den vil sjelden bli observert på plantene.

**Utseende:**

Fullvoksne: Opptil 1 mm, lysbrune med 4 par bein  
Larver og første nymfestadiet: Hvite med 3 par bein

**Klimakrav:**

*Stratiolaelaps scimitus* fungerer best i porøs, fuktig, men ikke for våt jord. Minimum temperatur bør være 15 °C.



**Bruksrettleiding:**

Preparatet ristes forsiktig før bruk, og innholdet fordeles i kulturen ved å strø innholdet jevnt ut, eller i små hauger (ca en spiseskje) på vekstmediet til plantene. *Stratiolaelaps scimitus* vil etablere og formere seg best hvis de legges i små hauger.

	Antall pr m <sup>2</sup>	Ant. m <sup>2</sup> pr 10 000 dyr	Ant. behandlinger
Forebyggende	100	100	1
Lett bekjempelse	200	50	1
Kraftig bekjempelse	200	20	1

**Integrert plantevern:**

*Stratiolaelaps scimitus* tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot nytteorganismer (se «side effect list»). *Stratiolaelaps scimitus* kan kombineres med *Steinernema feltiae* og de fleste andre nytteorganismer mot hærmygg og andre skadegjørere.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres noen dager ved 15 – 20 °C i mørke. Sørg for ventilering slik at CO<sub>2</sub> som dannes slippes ut.

**Forsiktighetsregler:**

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt.**

**batchnr.):** Se forpakning

